

# CUIDADOS COM MEDICAÇÃO E CIRURGIA



 *Dr. Adelmo Almeida*

[WWW.DRADELMOALMEIDA.COM.BR](http://WWW.DRADELMOALMEIDA.COM.BR)



Suas medicações podem necessitar de ajustes no período pré operatório. É muito importante que você informe ao seu cirurgião e equipe de assistentes sobre todos os remédios que está usando antes da sua cirurgia, inclusive medicações prescritas pelo médico, vitaminas, minerais, substâncias naturais, ervas medicinais, drogas, ou outros suplementos.

Mesmo estando em jejum, você poderá ser capaz de tomar alguns tipos de medicações de uso contínuo matinal, com um pequeno gole de água.

**Medicações que devem especialmente ser discutidas com seu médico:**

ANTICOAGULANTES E ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

MEDICAÇÕES PARA O DIABETES

ANALGÉSICOS, MEDICAÇÃO PARA ANSIEDADE OU DEPRESSÃO.

NICOTINA, ÁLCOOL, MACONHA, PRODUTOS DERIVADOS DO CANABINOL.

OUTRAS DROGAS.

## MEDICAÇÕES ANTICOAGULANTES

Antiagregantes plaquetários: Ajudam a evitar a formação de coágulos (ex. AAS, aspirina, clopidogrel)

Anticoagulantes: afinam o sangue, reduzindo a velocidade do processo de coagulação (ex: varfarina, heparina, xarelto, clexane).

Anti inflamatórios não esteróides: reduzem o processo de inflamação, dor ou febre (ex: aspirina, celecoxib, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, piroxicam, meloxicam, nimesulide)

Ervas: plantas medicinais (ex: ginkgo biloba, vitamina E, ginseng, omega 3, óleos de peixe)



### PERGUNTE AO SEU MÉDICO:

Qual é o seu risco para trombose venosa e se suas medicações anticoagulantes precisam ser suspensas ou modificadas antes da cirurgia.

Qual é o seu risco para sangramento. Procedimentos dentários, de pele, cirurgias de baixo risco de sangramento, geralmente não necessitam suspensão do uso de medicações.

Se é necessário suspender o uso das suas medicações naturais. Alguns suplementos podem afetar a coagulação sanguínea, aumentar os riscos de hemorragia interna, interagir com outras medicações.

### OUTRAS MEDICAÇÕES:

DIABETES (insulina, metformina, insulina Lantus, Glibenclamida, Glimepirida)

A partir do momento que você não estará se alimentando antes da cirurgia, deverá ser ajustada. Insulina Lantus deverá ter a dose reduzida em 50 %.

MEDICAÇÕES PARA DOR, ANSIEDADE E DEPRESSÃO (tramadol, codeína, morfina,

pregabalina, diazepam, benzodiazepínicos em geral)

Essas medicações podem afetar o seu plano de analgesia (controle da dor) e também os efeitos colaterais dos opioides.

NICOTINA, ÁLCOOL, MACONHA, CANABINOL, DROGAS ILÍCITAS

Uso de alguns desses produtos pode afetar seu ritmo cardíaco, pressão sanguínea, plano de controle da dor, durante os procedimentos.