

PREVENÇÃO DE TROMBOSE E TROMBOEMBOLISMO



 *Dr. Adelmo Almeida*

WWW.DRADELMOALMEIDA.COM.BR



Não é por acaso que colocamos esta parte em vermelho, trata-se das recomendações mais importantes principalmente para as pacientes com maior risco de trombose e com cirurgias com mais de 3 horas de duração.

Para explicar o que é “Trombose” de forma leiga, seria o sangue coagular dentro do sistema venoso formando um tampão impedindo a passagem do sangue, o local mais comum são nas pernas.

Tromboembolismo seria quando este trombo ou coágulo se solta do interior da veia e vai parar na circulação de outro órgão como o cérebro, pulmão, coração e causar lesão irreversível ou até a morte.

A “batata da perna” ou panturrilha tem a função de bombear sangue que desce para os para as pernas de forma a ajudar no retorno ao coração, isso acontece quando caminhamos e assim mantemos circulação constante e o sangue não coagula.

Qualquer situação em que o sangue circule devagar teremos o aumento do risco de formar coágulos(trombos) assim ocorre em cirurgias muito prolongadas em que a paciente fica imóvel por muito tempo. Vários outros fatores aumentam o risco da formação de trombose, fatores hereditários, tabagismo, diabetes medicamentos e muitos outros.

Cuidados durante a cirurgia

Durante a cirurgia utilizamos os meios disponíveis para reduzir o risco de formação de coágulo:Os membros inferiores são mantidos elevados em 30º durante toda a cirurgia de forma a ajudar no retorno venoso.

Hiper hidratação venosa ou a infusão venosa de soro fisiológico além das necessidades básicas do corpo com a intenção de manter o sangue “fino” é outra de forma de diminuir o risco de trombose.

Em casos de alto risco associamos medicamentos anticoagulantes para ajudar na prevenção.

Cuidados pelo paciente

O risco de trombose é maior até o 15º dia após a cirurgia, portanto os cuidados devem continuar nesse período.

As orientações a seguir são de extrema importância principalmente para as cirurgias com mais de 3 horas.

Tomar 3 litros de água ou mais por dia. Por 15 dias observe a cor da urina que deve estar sempre bastante clara , caso apresente amarelo forte deve aumentar a quantidade de água ingerida.

Ao deitar ou sentar deve manter as pernas elevadas favorecendo o retorno venoso.

Caminhar pequenas distancia várias vezes ao dia, pelo menos de hora em hora, isso também ajuda o retorno venoso

TIRE SUAS DÚVIDAS:

FONE/WhatsApp: (74) 9 99307029

E-MAIL:

<https://kabirsakib.com/%ce%bb%ce%b5%ce%b2%ce%af%cf%84%cf%81%ce%b1-soft-tabs-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%87%cf%81/CONTATO@DRADELMOALMEIDA.COM.BR>